

Tasa de mortalidad


La **tasa de mortalidad** es la relación entre la cantidad de defunciones o muertes cada 1000 habitantes en un tiempo y lugar determinados. Se calcula dividiendo la cantidad de muertes por el número de población total y se multiplica el resultado por 1000. Según la Cepal, la tasa de mortalidad de América Latina y el Caribe del período 2015-2020 es del 6‰, esto quiere decir que durante ese período cada 1000 personas hay seis defunciones en esta región. Según el Banco Mundial, la tasa de mortalidad de América Latina y el Caribe bajó entre 1960 y 2016 del 13‰ al 6‰. Esta reducción suele estar vinculada a factores alimentarios y sanitarios (como la creación y difusión de vacunas y medicamentos, una mejor higiene personal y urbana, los avances técnicos en la medicina, por ejemplo, en el área de las cirugías).

Por su parte, la tasa de **mortalidad infantil** es un indicador bastante preciso del estado sanitario de una población. Estima la muerte de niños menores de un año en relación con la cantidad de niños nacidos vivos en un período y lugar determinados. Según la Cepal, la tasa de mortalidad infantil de América Latina y el Caribe es del 16,1‰ para el período 2015-2020. Los valores más extremos de esta tasa en los países de esta región corresponden a Bolivia (38,1) y Haití (39,0), por un lado, y a Cuba (5,3), Puerto Rico (5,4) y Chile (6,7), por el otro.

Otros indicadores relacionados con el aspecto sanitario son las tasas de **incidencia** y de **morbilidad**. La tasa de incidencia estima la cantidad de enfermedades nuevas en un período y lugar determinados en relación con su población total. La tasa de morbilidad calcula la cantidad de defunciones relacionadas con esa enfermedad. La información que brindan estas tasas es fundamental para determinar las principales carencias sanitarias de una población e intentar modificarlas para mejorar la calidad de vida. En México, por ejemplo, en las primeras décadas del siglo xx, las tasas de morbilidad más altas eran las de la neumonía, la influenza, las diarreas, la fiebre palúdica, la tos ferina y la viruela, mientras que en las primeras décadas del siglo xxi son las de la diabetes, las enfermedades del corazón, los tumores malignos y las enfermedades vinculadas con el hígado, como la cirrosis.

▼ Tasa de mortalidad por países seleccionados y media regional (en ‰) en 1960-2016.

Fuente: Banco Mundial.



Índice de femineidad e índice de masculinidad

El índice de femineidad indica la **cantidad de mujeres por cada 100 varones** en una población dada. De la misma manera, el índice de masculinidad indica la **cantidad de varones por cada 100 mujeres** en una población dada.

El índice de femineidad se calcula dividiendo la cantidad de mujeres por la cantidad de varones y multiplicando esa relación por 100. El índice de masculinidad se estima de modo